

Bijwerkingen Bravecto

Het persoonlijke verhaal van Rico and Mika (001)

Facebook Groep: **Is Bravecto Veilig**
Website: www.isbravectoveilig.nl



MIJN HOND RICO IS DE REDEN VOOR DE START VAN DE FACEBOOK GROEP "IS BRAVECTO VEILIG" EN DE WEBSITE WWW.ISBRAVECTOVEILIG.NL . Hier vertel ik het verhaal van Rico Een fantastische, tot voor kort kerngezonde hond (kruising Hollandse Herder x Mechelse Herder). Om hem te beschermen tegen ziektes als "Lyme disease" enzovoort, gaven we onze beide honden het anti-teken/vlooien-middel Bravecto. Maar in plaats van hem te beschermen, vergiftigde dit middel zijn lichaam, en overleed hij binnen een maand. En dit is dus gebeurd met veel meer honden. Fabrikant MSD/MERCK ontkent ieder verband. En het middel wordt bij alle dierenartsen enorm gepromoot als "een veilig middel", wat het dus zeker niet is!

Naam van mijn honden: Rico (rechts) and Mika (links)

Leeftijd: Rico 12 jaar / Mika 1,5 jaar

Ras:

Rico: Kruising Hollandse Herder x Mechelse Herder (reu, 25 kg)

Mika : West Siberische Laika (teef 20 kg)

Dosis van Bravecto:

Rico: 1000 mg (20-40 KG)

Mika: 500 mg (10-20 KG)

Datum dat het middel werd gegeven:

01 februari 2016

Datum dat de eerste symptomen begonnen:

03 februari 2016

Officieel klacht gerapporteerd aan MSD/MERCK: Ja

Eigenaar:

Michael v.d. Sande

Land:

Nederland

Het verhaal van mijn hond en Bravecto:

Allebei onze honden waren heel gezond en vitaal tot de dag dat we Bravecto gaven. Ze konden allebei lange afstanden lopen zonder problemen. We gaven het middel aan onze beide honden op 01 februari 2016, vlak voor vertrek voor onze vakantie naar Spanje (met de auto).

Twee dagen later begonnen beide honden aanvalsgewijs hele heftige naar lucht snakkende geluiden te maken ("gasping"). Het bleek dat beide honden tijdens die aanvallen heftige en onregelmatige hartritmes hadden.

Vanaf 05 februari 2016 was de conditie van onze hond Rico dramatisch slecht. Hij kon nauwelijks meer 20 meter lopen, begon enorm te kwijlen, met zijn kop naar beneden hangend. Meerdere keren raakte hij daarbij onwel. De volgende dagen namen we Rico alleen mee voor hele korte wandelingen. Uit eerdere ervaringen met een andere hond dachten we aan "Hartfalen". Omdat de gezondheidstoestand van Rico verslechterde, besloten we vervroegd naar huis af te reizen op 16 februari, en bij aankomst in Nederland meteen onze eigen dierenarts te bezoeken.

Hij dacht ook meteen aan "Hartfalen", en stelde meteen voor om een röntgenfoto te maken. Daaruit bleek al direct dat er met zijn hart en longen helemaal niets aan de hand was. Zagen er prima uit. Dat gaf ons (volledig onterecht) weer hoop. Een bloedtest gaf geen abnormale waarden aan (alleen een lichte afwijking van de leverwaarden).

De volgende dagen ging het pas echt mis. Rico kreeg ernstige koorts (40,5 graden Celsius) en ademde zeer snel maar oppervlakkig. Heel opvallend daarbij was dat de buikspieren helemaal niet meededen bij de ademhaling. Dit duurde ongeveer anderhalve week, dag en nacht. Aanvankelijk at hij nog wel wat, maar zijn eetlust werd minder. In enorm korte tijd verloor hij ontzettend veel gewicht. Iets dat we bij geen enkele hond eerder zo snel hebben zien gebeuren.

De koorts verdween rond 25 februari 2016. We kregen weer hoop dat het de goede kant uitging. Rico uitlaten was nog steeds een moeizaam iets. Hij had een waggelende loop (heen en weer bewegend met zijn kop). Eetlust had hij al nauwelijks meer. Zijn reukzin was compleet verstoord. Eten dat vlak voor hem lag, nam hij niet waar. Zijn urine werd ineens donkerbruin. Rico kon nauwelijks meer op zijn poten staan, geen ontlasting meer, en plassen lukte ook niet meer. Rico overleed één maand nadat hij Bravecto had gekregen.....



DE SYMPTOMEN DIE RICO HAD TOT AAN DE DAG DAT HIJ OVERLEED :

1. Vanaf de tweede dag aanvalsgewijs zeer heftige hartslag/hartritmestoornis. De hond maakt daarbij heftige, naar lucht snakkende geluiden ("gaspings", dit vindt plaats bij zowel Rico als Mika, dus beide honden). Rico laat zijn kop hangen, kwijlend, met doorgezakte rug staand.
2. Bewustzijnsverlies / onwel worden
3. Dwangmatig geeuwen, maakt smakkende geluiden (iets dat geen normaal gedrag is bij deze hond)
4. Braken
5. Afname van rode bloedcellen (Anaemia)
6. Hyperthermia, zeer hoge koorts van 40,5 graden Celsius voor meer dan een week, later alleen lichte koorts 's nachts
7. Zeer snelle maar heel oppervlakkige ademhaling (Tachypnoea)
8. Een waggelende loop, alsof hij dronken is, daarbij met zijn kop van links naar rechts bewegend. Nauwelijks energie om te lopen
9. Heel opvallend: de hond lijkt slechte controle te hebben over zijn spieren. Wanneer hij gaat liggen, valt hij hard met zijn kop op de grond
10. Spierzwakte (gaat vaak heel snel weer liggen)
11. Spiersamentrekkingen (muscle tremor)
12. Lethargy (toestand van geestelijke ongevoeligheid), apathy

13. Lusteloos/futloos tijdens het lopen. Stopt dan plotseling, "alsof zijn batterijen leeg zijn", loopt weer een klein stukje, stopt weer, enzovoorts.

14. Extreem gewichtsverlies in zeer korte tijd

15. Geen reukzin (nam geen voedsel waar vlak voor zijn neus)

16. Geen eetlust, stopt geheel met eten (drinkt wel water)

17. Vrij plotseling donkerbruine urine

18. Snelle ademhaling tijdens de nacht (de laatste nacht voor zijn dood)

19. Rico overlijdt één maand na toediening van Bravecto

20. **Vermoedelijke oorzaak van zijn dood** : de symptomen van Rico lijken sterk op de symptomen van Pancreatitis (met name ook het extreme gewichtsverlies in zeer korte tijd). Intoxicatie (vergiftiging) kan de oorzaak zijn voor het ontstaan van Pancreatitis.

Er zijn een variatie aan symptomen die kunnen worden waargenomen in het geval van Pancreatitis, zoals:

Koorts

Braken

Diarree

Verlies van eetlust (anorexia)

Gewichtsverlies

Uitdroging

Vermoeidheid en loomheid/lusteloosheid

Lichte tot heftige pijn in de onderbuik (kan erger worden na het eten)

Depressie

Verhoogd hartritme

Moeite met ademen

Wanneer er sprake is van Pancreatitis, beginnen de spijsverteringsenzymen met de versnelde afbraak van vetten en eiwitten in de andere organen, evenals in de Pancreas. In feite begint het lichaam zichzelf te verteren. Omdat ze dicht bij de Pancreas liggen, worden vervolgens ook de lever en de nieren aangedaan. Wanneer er bloedingen plaats vinden in de Pancreas kan er shock ontstaan, zelfs met de dood tot gevolg.

*** Rico (een gezonde, levendige hond) stierf één maand nadat hij Bravecto kreeg toegediend. Vermoedelijke oorzaak: Bravecto teken/vlooiën-middel (een insecticide middel) dat een vergiftiging veroorzaakte. De symptomen leken sterk op Acute Pancreatitis (acute ontsteking van de Pancreas).**

*** Mika heeft (2 maanden na toediening van het middel) af en toe nog steeds hartritme stoornissen, waarbij ze weer die naar lucht snakkende geluiden maakt. Vertoont verder heel vreemd gedrag wanneer ze haar voeding krijgt (zeer slechte eetlust). Ook eten waar ze voorheen helemaal gek op was, lust ze nog steeds niet.**

Voor zover we kunnen beoordelen, lijken er nu uitwendig geen verdere verschijnselen te zijn.

Bravecto (actief ingrediënt "Fluralaner") doodt teken en vlooien voor tenminste 3 tot 4 maanden na toediening. Dus ook dan kunnen er nog steeds bijwerkingen optreden bij de hond.

NOTE: Ook wanneer een eerste dosis geen bijwerkingen lijkt te veroorzaken, kan een tweede dosis ernstige complicaties geven. Er zijn aanwijzingen dat het "stapelen" van dit middel het risico sterk vergroot.

© website: www.isbravectoveilig.nl

Facebook groep: "Is Bravecto Veilig" <https://www.facebook.com/groups/isbravectoveilig/>